

安徽师范大学

2018 年硕士研究生招生考试初试试题

科目代码: 906

科目名称: 普通物理学 II

一、计算题(共 5 小题, 每题 10 分, 共 50 分)

- 1、两个点电荷 $+q$ 和 $-3q$ ($q>0$), 相距为 d , 在它们的连线上电场强度为零的位置与电荷为 $+q$ 的点电荷相距多远? 若选无穷远处为电势零点, 两点电荷之间电势为零的位置与电荷为 $+q$ 的点电荷相距多远?
- 2、一半径为 R_1 的导体球外有一同心导体球壳, 球壳内外半径分别为 R_2 和 R_3 , 内球所带电量为 $+q$, 外球壳所带电量为 $-2q$, 则球壳的电势是多少? (以无穷远处为电势零点)
- 3、如图 1 所示, 一无限长直导线通有电流 I_0 , 其旁放一直导线 AB , 长为 L , A 端相距无限长导线为 d , AB 通有电流 I , 二者在同一平面上, 求导线 AB 所受到的磁力。
- 4、设一长直螺线管长为 l , 半径为 R , 总匝数为 N , 充满磁导率为 μ 的磁介质(设 μ 为恒量), 试计算长直螺线管的自感系数 L 。
- 5、使自然光通过两个偏振化方向成 60° 角的偏振片, 透射光的强度为 I_1 , 今在这两个偏振片之间再插入另一偏振片, 它的偏振化方向和前面两个偏振片均成 30° 角, 则透射光强为多少?




图 1

二、综合应用题(共 5 小题, 每小题 20 分, 共 100 分)

- 1、如图 2 所示, 一球形电容器, 内、外导体球壳 A 和 B 的半径分别为 R_1 和 R_2 , 两球壳间充满两层球壳形的均匀各向同性介质, 介质的相对介电常数分别为 ϵ_{r1} 、 ϵ_{r2} , 两介质分层处半径 R 。设内、外球壳带电量分别为 $\pm Q$, 求: 两介质区内任一点(离球心 r 处, 且 $R_1 < r < R$ 和 $R < r < R_2$)的电位移 \vec{D} 、电场强度 \vec{E} 、电极化强度 \vec{P} 以及电势 U 。




图 2

2、一无限长同轴电缆由一导体圆柱体和一同轴导体圆筒(其厚度忽略不计)构成, 使用时电流 I 从圆柱体流进去, 从圆筒流回, 电流都均匀分布在横截面上。设圆柱体的半径为 R_1 , 圆筒的半径为 R_2 , 试求: (1) 导体圆柱体内($r < R_1$); (2) 两导体之间($R_1 < r < R_2$); (3) 导体圆筒之外($r > R_2$)各点的磁场强度 \vec{H} 的大小。

3、如图 3 所示, 有一无限长直导线, 载有直流电流 I , 近旁有一个两条对边与它平行并与它共面的矩形线圈, 线圈共有 N 匝, 线圈长为 a , 宽为 b , 当线圈以匀速度 v 沿垂直于导线的方向离开导线。求: 线圈运动到任意位置 x 处(x 为线圈最左边与长直导线的距离), 通过矩形线圈的磁通量; 以及在该位置时矩形线圈中的感应电动势。




图 3

4、如图 4 所示, 波长为 λ 的单色光以 φ 角入射到间距为 d 的双缝上, 若双缝到屏的距离 D ($D \gg d$), 试求: (1) 各级明条纹位置 x_k ($x_k \ll D$, 故 $\tan \theta \approx \sin \theta$); (2) 相邻两级明条纹的间距; (3) 若想使零级明纹移至屏幕 O 点处, 则应在 S_2 缝处放置一折射率为 n 厚度为多少的透明介质薄片?




图 4

5、波长 $\lambda = 600 nm$ 的单色光垂直入射在一光栅上, 第 2 级明纹出现在 $\sin \phi_2 = 0.20$, 第 4 级缺级, 试求: (1) 光栅常数($a+b$); (2) 光栅上狭缝可能的最小宽度 a ; (3) 按上述选定的 a 、 b 值, 在屏上可观察到的全部主极大的谱线条数为多少?